

EDITION DE LA STATION "ILE DE FRANCE"

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SAINT-DENIS, VAL DE MARNE,
ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

47, rue Paul Doumer, 93100 MONTREUIL - Tél. 287.76.71

ABONNEMENT ANNUEL 60 F

Régisseur de Recettes - D.D.A.-P.V.-Services Vétérinaires
107 bis, rue du Faubourg Saint-Denis. 75010 PARIS

C C P 9063 96 U PARIS

BULLETIN N° 185 - 12 MAI 1982

EDITION GRANDES CULTURES - ENVOI N° 5.

CHARANCONS DES SILIQUES**COLZA**

Il est nécessaire de surveiller les populations de Charançons des siliques, très variables d'une parcelle à une autre. Effectuer des comptages sur une cinquantaine de plantes choisies au hasard à 10 m de la bordure du champ. Dès que le seuil de traitement est atteint, 1 charançon par pied, intervenir avec un produit non dangereux pour les abeilles. (voir bulletin du 30 avril)

ALTERNARIA

Actuellement on n'observe pas de taches sur siliques, mais seulement sur les feuilles âgées de la base. Une surveillance des cultures s'impose pour détecter l'apparition éventuelle des premiers symptômes sur siliques. Pour les conseils de lutte, voir bulletin du 30 avril.

MALADIES DU PIED**BLE D'HIVER**

Le Piétin-verse, le Rhizoctone et la Fusariose sont présents partout à un degré faible en général. Ne pas envisager systématiquement un traitement.

Pour le Piétin-verse, le seuil de traitement est actuellement de 20 à 25 % de talles atteintes au niveau de la tige.

Pour le Rhizoctone, en cas de présence généralisée sur les gaines au niveau du 2ème ou 3ème entre noeud, il est possible d'intervenir avec un produit à base de Bénomyl, Thiophanate méthyl ou Carbendazime.

SEPTORIOSES

La période pluvieuse ayant assuré des contaminations, il est nécessaire d'intervenir dès maintenant si la maladie est déjà présente dans la parcelle. Il est impératif de traiter avant l'apparition de nouveaux symptômes, les produits ayant une action curative souvent limitée. Pour la liste des produits à utiliser, voir bulletin du 6 avril.

Attention : ne pas confondre les symptômes de Septoriose avec les dessèchements d'extrémité des feuilles dus au froid et au vent.

ROUILLE JAUNE

Quelques foyers sont signalés dans le secteur de Bray sur Seine et dans le sud de Seine et Marne.

Intervenir dès l'apparition des premiers foyers dans la parcelle.

OIDIUM

De nombreuses variétés présentent des symptômes d'Oïdium. Si l'attaque atteint les feuilles supérieures, il est nécessaire d'intervenir avec un produit spécifique.

ESCOURGEON ET ORGE D'HIVER

Actuellement, on observe essentiellement de la Rhynchosporiose. Lorsqu'un traitement a été réalisé au stade 1-2 noeuds, il est inutile d'envisager un 2ème traitement avant le stade gonflement et seulement en présence de maladie.

Surveiller l'évolution de la Rhynchosporiose et le stade végétatif. Attention, la variété Barberousse est au stade sortie des barbes.

Si une intervention est envisagée au stade gonflement, tenir compte de la présence éventuelle de Rouille naine ou d'Helminthosporiose (taches brunes en réseau uniquement).

ORGE DE PRINTEMPS

De nombreuses parcelles sont attaquées par l'Oïdium. Si nécessaire, intervenir avec un produit spécifique anti-Oïdium.

REMARQUE GENERALE

Les ravageurs sur céréales à paille sont très rares actuellement et ne justifient aucune intervention.